

recombinant human CYP2C8 (+b5) microsomes

この度は、弊社製品をご注文いただきまして、ありがとうございます。ご注文いただきました ProCube®W_CYP2C8(+b5)の生産結果を掲載しておりますので、ご確認ください。今後とも弊社製品をより一層のご愛顧のほどよろしくお願ひ申し上げます。

【商品情報】

名称	recombinant human CYP2C8 (+b5) microsomes
タンパク質	Cytochrome P450 2C8
Accession No.	NM_000770
由来	ヒト
分子量 ¹⁾	56.8 kDa.
宿主	バキュロウイルス
備考	P450 還元酵素 (Cytochrome P450 reductase, CPR) 共発現 C 末端 FLAG®タグ付与 Cytochrome b ₅ 精製品添加

【性能】

容量	0.5 mL × 6 本
総タンパク質濃度 ²⁾	5.0 mg/mL
ヘム含有 P450 濃度 ³⁾	113 pmol/mg
代謝活性値 ⁴⁾	4.2 pmol/min/pmol CYP
Cytochrome b ₅ 濃度	20 nmol/mL
バッファー	100 mM potassium phosphate (pH 7.4), 250 mM sucrose, 0.25 mM EDTA
Lot.	160309

- 1) Calculated from the protein sequence with FLAG®-tag.
- 2) Bradford protein assay.
- 3) Carbon monoxide difference spectrum.
- 4) Paclitaxel 6α-hydroxylation.

【代謝活性測定方法】

Paclitaxel 6α-hydroxylase activity

1. 以下の組成から成る反応液 480 μL を調製し、前保温する. (37°C, 2 分間)
 - 1.3 mM NADP⁺
 - 3.3 mM glucose-6-phosphate
 - 3.3 mM MgCl₂
 - 0.4 U/mL glucose-6-phosphate dehydrogenase
 - 20 μM paclitaxel
 - 50 mM potassium phosphate (pH 7.4)
2. 反応液に CYP2C8 ミクロソーム 20 μL を加え、反応を開始する. (37°C, 反応時間 : 20 分)
3. Acetonitrile 150 μL を加えて反応を停止させる.
4. 遠心分離する. (15,000×g, 4 分間)
5. 上清 200 μL をバイアルに移し、UPLC により代謝物を定量する.

【使用上または取扱上の注意】

- 本品は研究用途以外の目的には使用しないでください.
- 【遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律に基づく情報提供】本品は遺伝子組換え生物等の規制による生物多様性の確保に関する法律施行規則第 16 条第 1 号、第 2 号または第 4 号に基づく使用等には該当いたしません。本品は組換えバキュロウイルスが含まれる可能性がありますので、使用・保管・運搬の際は適切な拡散防止措置を執ってください。
- 本品を廃棄する際は、オートクレーブ処理 (121°C, 20 分以上) をしてください。
- 本品は熱に不安定な酵素です。融解後、実験を開始するまで氷中で保管してください。
- 本品は長期保存や凍融解をくり返すと品質に影響を及ぼす場合があります。納品後または開封後はすぐにお使いください。

【貯蔵方法】 -80°C

【問合せ先】 製品に関するお問合せは下記までお願いいたします。

シスメックス株式会社